Medidas de Bioseguridad en el ámbito Prehospitalario para el acopio y traslado de pacientes con patología respiratoria.

COVID 19

MINISTERIO DE SALUD

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

MEDIDAS DE PRECAUCIÓN Y CONTACTO.

- Higiene de manos según OMS.
- Uso de guantes.
- Protección ocular (máscaras o antiparras).
- Barbijo quirúrgico (el N95 solo se utiliza para procedimientos de toma de muestra e instrumentación de la vía aérea).
- Camisolín antifluidos.
- Práctica segura de extracción de sangre e inyecciones.

Colocación de equipo de protección personal (EPP) para pacientes respiratorios COVID 19.

1 Camisolín

2 Barbijo quirúrgico

3 Gafas o máscara facial

4 Guantes

MINISTERIO DE SALUD

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

COLOCACIÓN DE CAMISOLÍN:





BARBIJO N95.

Recomendado para instrumentación de la vía aérea (intubación OT o toma de muestra)

OPS - Mascarillas faciales durante brotes: quién, cuándo, dónde y cómo usarlas https://www.paho.org/

MINISTERIO DE SALUD
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

COLOCACIÓN DE PROTECCIÓN OCULAR / FACIAL:





COLOCACIÓN DE GUANTES:



MINISTERIO DE SALUD

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RETIRO DE GUANTES:

- ¡El exterior de los guantes está contaminado!
- Tome la parte exterior del guante con la mano opuesta en la que todavía tiene puesto el guante y quíteselo.
- Sostenga el guante que se quitó con la mano enguantada.
- Deslice los dedos de la mano sin guante por debajo del otro guante que no se ha quitado todavía a la altura de la muñeca.
- Quítese el guante de manera que acabe cubriendo el primer guante.
- Arroje los guantes en el recipiente de deshechos.



RETIRO DE PROTECCIÓN OCULAR / FACIAL:

- ¡El exterior de las gafas protectoras o de la careta está contaminado!
- Para quitárselas, tómelas por la parte de la banda de la cabeza o de las piezas de las orejas.
- Colóquelas en el recipiente designado para reprocesar materiales o de materiales de deshecho.



MINISTERIO DE SALUD

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

RETIRO DE CAMISOLÍN:

- ¡La parte delantera de la bata y las mangas están contaminadas!
- Desate los cordones.
- Tocando solamente el interior de la bata, pásela por encima del cuello y de los hombros.
- Voltee la bata al revés.
- Dóblela o enróllela y deséchela.



RETIRO DE BARBIJO:

- La parte delantera del barbijo o mascarilla está contaminada. ¡NO LO TOQUE!
- Primero tome los cordones o banda elástica de arriba y por último quítese la mascarilla, sosteniéndola por las tiras.
- Arrójela en el recipiente de deshechos.

MINISTERIO DE SALUD

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

Recomendaciones durante el traslado de paciente sospechoso o confirmado.

- Notificar del traslado al centro receptor del paciente.
- Limitar el número de personas en el vehículo, especialmente en el habitáculo del paciente.
- Si el paciente requiere cánula nasal, el barbijo se colocará por encima de la misma.
- Si el paciente requiere intubación o manejo de la vía aérea, al igual que para la toma de muestra, debe colocarse un barbijo N95.
- Todo el personal debe evitar tocarse la cara durante el procedimiento.
- Cerrar todas las ventanillas, principalmente la que conecta el habitáculo posterior con el anterior para aislar del conductor. (De preferencia se utilizarán vehículos de compartimiento separados).
- No prender los ventiladores de re circulación del móvil.

Limpieza y desinfección del vehículo.

LIMPIEZA:

- Trapeador o paño húmedo.
- Recipiente con solución con agua y detergente de uso doméstico. Sumergir el paño en la solución, escurrir y friccionar todas las superficies a limpiar.
- Enjuagar con segundo paño sumergido en otro recipiente con solución de agua y detergente.

DESINFECCIÓN:

- Colocar 100ml de lavandina en 10 litros de agua.
- Sumergir el trapeado o paño en la solución con hipoclorito de sodio y friccionar la superficie a desinfectar. Dejar secar.

Limpieza y desinfección del vehículo.

- Luego de la desinfección y limpieza, dejar abiertas las puertas traseras para ventilar.
- El personal de limpieza debería usar camisolín y guantes desechables. Si se anticipan salpicaduras o aerosolización usar además barbijo y gafas.
- Limpiar y desinfectar a fondo sobre todo en las superficies de contacto con el paciente (ej: camilla, paneles de control, piso, paredes).
- Limpiar y desinfectar equipos antes de utilizar con otros pacientes según instrucciones del fabricante.

PERSONAL	ACTIVIDAD	EPP
Médico /Enfermero /Técnico	Transporte de paciente SOSPECHOSO COVID-19 a centro sanitario de referencia.	Camisolín Barbijo Gafas Guantes
Conductor	Solo Conduce. Sin contacto con el paciente sospecha de COVID 19. Habitáculo separado.	No requiere EPP
	Ayuda a la carga y descarga del paciente sospechosos de COVID 19.	Camisolín Barbijo Gafas Guantes
	Solo Conduce. Sin contacto con el paciente sospecha de COVID 19. Habitáculo sin separación con el paciente.	Barbijo
Paciente	Traslado al centro de referencia.	Barbijo

Precauciones dentro del establecimiento al ingreso con el paciente sospechoso o confirmado.

Sala de aislamiento

Camisolín

Guantes

Antiparras

Restringir las visitas

Lavado de manos

Barbijo quirúrgico

Elementos exclusivos

Limitar traslados

Limpieza y desinfección por turno

MINISTERIO DE SALUD

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES