

ALGORITMO PARA ALTA DE AISLAMIENTO DE CASOS DE COVID-19

PACIENTE CON DIAGNÓSTICO DE COVID-19 CONFIRMADO QUE PRESENTA:

- Factores de riesgo: Edad ≥ 60 años, diabetes, enfermedad cardiovascular o respiratoria crónica, insuficiencia renal, cirrosis, inmunocompromiso o embarazo.
- Neumonía / Hipoxemia.
- Otro criterio de internación.

SI

Instituciones Hospitalarias

Resolución de la fiebre sin el uso de antipiréticos durante al menos 72 horas

+

mejoría o no empeoramiento de los síntomas respiratorios. (no considerar disgeusia/anosmia)

+

rt-PCR negativa en dos muestras respiratorias consecutivas recolectadas con una separación de ≥ 24 horas.

NO

Instituciones de seguimiento intermedio

- Personal de salud.
- Residentes y/o personal que trabaja en instituciones cerradas o de internación prolongada.
- Fuerzas de seguridad.
- Personas que brinden asistencia a personas con factores de riesgo para formas graves de COVID-19.

Al menos 10 días después de la aparición de síntomas

+

al menos 72 horas después de la desaparición o no empeoramiento de los síntomas respiratorios (no considerar disgeusia/anosmia).

sin necesidad de rt-PCR

ALTA DE AISLAMIENTO